



Patientinformation

Läkemedelsbehandling av migrän under amningsperioden

Grundregeln under amningsperioden är att inte använda några läkemedel alls. Hos en del ammande kvinnor kan dock migränattackerna bli så plågsamma att någon typ av behandling blir nödvändig. Erfarenheten av att använda läkemedel i samband med amning är begränsad. Användning av läkemedel får göras utifrån den kunskap som finns om hur läkemedel passerar över till modersmjölken med risk för att läkemedlet även kommer att kunna påverka barnet. Vid val av läkemedelsbehandling av migrän under amningsperioden måste fördelarna för modern vara större än de möjliga riskerna för barnet. Medicinering bör därför alltid ske i samråd med läkare. Följande riktlinjer är rekommendationer för Migränkliniken patienter.

- I första hand bör receptfria läkemedel som innehåller paracetamol (Panodil, Alvedon m.fl.) användas under amningsperioden. Alvedon kan också kombineras med läkemedel mot illamående (Primperan m.fl.), helst inte mer än 2-3 gånger per vecka.
- I andra hand kan en receptbelagd kombination av paracetamol och kodein (Panocod, Citodon) användas. Läkemedel med acetylsalicylsyra eller NSAID (Magnecyl, Treo, Bamyl, Voltaren, Pronaxen, Iprex m.fl.) kan också användas, helst inte mer än 2-3 gånger per vecka.
- Om inget av ovanstående är tillräckligt kan Imigran prövas, i första hand som nässpray. Dock skall påpekas att kunskapen om behandling med Imigran under amningsperioden inte är tillräcklig för att bedöma riskerna för barnet. Vid amning rekommenderas därför att barnet ammas (alternativt att mjölken pumpas ur) innan Imigran används. När det gått 8 timmar efter medicinering med Imigran pumpas mjölken ur och slängs. Därefter kan barnet ammas igen.