

STROKE

- propp eller blödning i hjärnan
Vid plötsliga symtom RING 112

Testa stroke med AKUT-test

Ansikte

Ansiktsförlamning?

Le och visa tänderna.

Är personen sned i ansiktet?

Hänger mungipan? **RING 112**



Kroppsdelen

Förlamning i en arm?

Lyft armarna och håll kvar i 10 sekunder.

Har personen tecken till svaghet/förlamning i någon arm? **RING 112**



Uttal

Svårigheter att tala, läsa eller förstå tal?

Säg mening: "Det är vackert väder idag".

Har personen svårt att hitta ord, säga rätt ord eller talar sluddrigt? **RING 112**

Tid

Symtomen kommer plötsligt och måste behandlas snabbt!

För mer information besök www.strokeforbundet.se



STROKE

STROKE-Riksförbundet

STROKE

- propp eller blödning i hjärnan
Vid plötsliga symtom RING 112

Stroke är ett samlingsnamn för blodpropp i hjärnan eller hjärnblödning. Det ger en syrebrist i den del av hjärnan där blodproppen eller blödningen finns.

Symtomen vid TIA (transitorisk ischemisk attack) liknar dem som förekommer vid hjärninfarkt. De är dock snabbt övergående och varar oftast bara några minuter men kan sitta i upp till 24 timmar.

OBS! Åk till sjukhus även om symtomen gått tillbaka!

Lär dig känna igen tecken på stroke **Symtomen kommer plötsligt!**

Vanliga symtom är:

- Halvsidig förlamning
- Känslenedsättningar och domningar - ofta inom ena kropps- och ansiktshalvan
- Synrubbningar - i form av synnedläggelse eller förlust av synen på ena ögat eller del av bortfall av synfältet på båda ögonen
- Tal- och språkrubbningar. Svårigheter att tala och att förstå tilltal, att läsa, skriva och räkna
- Balansrubbningar och svårt att styra rörelserna
- Blixtrande huvudvärk (främst vid hjärnblödning)

Vill du veta mer om stroke, besök www.strokeforbundet.se

Stöd forskning om stroke
Strokefonden 90 05 30 – 7

Strokefonden kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.